Vitreolent®

OMNIVISION

Collyre

Propriétés/Emploi thérapeutique

Qu'est-ce que le collyre Vitreolent et quand est-il utilisé?

Le collyre Vitreolent est utilisé lors d'opacités et d'hémorragies du corps vitré, ainsi qu'en cas de cataracte sénile pour ralentir la progression de l'opacification.
Le collyre Vitreolent contient des iodures comme principe actif et ne doit être utilisé que sur prescription du médecin.

Complément d'information

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Le médecin vous a prescrit ce médicament pour traiter vos troubles oculaires actuels. Evitez de l'utiliser pour d'autres affections ou pour d'autres personnes.
Si vous utilisez, en dehors du collyre Vitreolent, d'autres médicaments pour les yeux, veuillez en informer votre médecin et respecter un intervalle d'au moins 5 minutes entre chaque application.

Remarque pour les porteurs de verres de contact

Les porteurs de lentilles de contact devraient appliquer le collyre Vitreolent en dehors de la période du port des verres et attendre 30 minutes avant de les remettre.

Contre-indications

Quand le collyre Vitreolent ne doit-il pas être utilisé?

En cas d'allergie aux iodures ou à l'un des composants contenus dans le collyre Vitreolent ou lors de troubles de la fonction thyroïdienne.

Précautions

Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de l'utilisation du collyre Vitreolent?

Veuillez informer votre médecin, si vous souffrez d'une autre maladie, si vous êtes allergique ou si vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!).

Grossesse/Allaitement

Le collyre Vitreolent peut-il être utilisé pendant la grossesse ou la période

On ne peut utiliser Vitreolent pendant la grossesse ou l'allaitement qu'avec l'autorisation du médecin ou du pharmacien.

Posologie/Mode d'emploi

Comment utiliser le collyre Vitreolent?

Appliquer 1 goutte 1 à 3 fois par jour dans le sac conjonctival de l'oeil atteint. Pencher la tête en arrière, tenir le flacon compte-gouttes d'une main en le plaçant verticalement au-dessus de l'oeil. Tirer la paupière inférieure légèrement vers le bas avec l'autre main et appliquer 1 goutte dans la partie située côté nez du sac conjonctival en appuyant sur le flacon sans toucher l'oeil avec l'embout.
Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef.
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est soit trop faible ou au contraire trop forte.

Effets indésirables

Quels effets indésirables le collyre Vitreolent peut-il avoir?

Un léger picotement ou une sensation de brûlure passagers peuvent se produire parfois juste après l'instillation.

Les principes actifs contenus dans les médicaments pour les yeux peuvent parvenir dans la circulation sanguine. Par conséquent, les effets secondaires ne se limitent pas seulement à l'oeil, mais peuvent se manifester dans toutes les régions corporelles.
Si vous constatez des effets secondaires, comme p.ex. l'acné à l'iode, pouvant avoir un rapport avec l'application du collyre, il faut consulter d'urgence votre médecin ou votre pharmacien.

Remarques particulières

De quoi faut-il en outre tenir compte?

Pour éviter toute contamination microbienne du collyre, il faut éviter tout contact entre l'embout du flacon et les doigts ou l'oeil.

Conservation

Le médicament ne peut être conservé au-delà de la date de péremption imprimée sur l'emballage avec la mention «EXP». Refermer le flacon immédiatement après l'emploi. Une fois entamé, le médicament ne doit pas être utilisé pendant plus d'un mois.

Stockage/Conservation

Le médicament se conserve dans son emballage d'origine fermé à température ambiante (15-25 °C). Les médicaments doivent être conservés hors de portée des enfants. Pour son élimination adéquate, veuillez remettre le flacon contenant le restant de médicament 30 jours après le début du traitement au point de vente (médecin ou pharmacien). Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales.

Composition

Principes actifs: Iodure de potassium 3 mg, Iodure de sodium 3 mg.
Conservateur: Acétate de chlorhexidine 0,1 mg, autres adjuvants.

Mode de vente/Présentation

En pharmacie, seulement sur ordonnance médicale.
Flacon compte-gouttes de 10 ml.

Distributeur

OmniVision SA, 8212 Neuhausen.

Mise à jour de l'information

Octobre 2001.